

第一大題作答區

注意：1. 限在作答區範圍內作答，本頁作答區共83格。2. 請妥善分配作答時間。
3. 不得污損、破壞或塗改應試號碼及條碼，亦不得書寫考生姓名、應試號碼或與答案無關之文字或符號。

(一)

十三歲至十五歲的國中男生應列為最優先宣導對象，因為第一其每週至少喝一次含糖飲料之人數百分比是最高的（百分之九十五點七），再者其每週平均喝的次數也是最多的（九次）。

(二)

我贊成中、小學校園禁止含糖飲料，綜合圖一比圖二來看，中小學生飲含糖飲料的人數和次數都在學校的中小學生可能會攝取過多糖分的機會比後者還大。高糖飲食不只會增加罹患多種疾病的風險，還是導致某些病痛元凶，因此在校園環境內，若能管制那些高風險食品銷售，尤其那常常人手一杯的含糖飲料，想必能減少未來罹患各項由高糖飲食所導致的疾病之人數。

此外，若能及早控管含糖飲料進入校園，較健康的飲食習慣。雖然中小學生能獲得含糖飲料，但來源不只僅有學校，還包含校園附近的商家等，若能禁止含糖飲料進入學生一天之中待最久的處所之一——學校，或多或少應該會對這個問題有些許的幫助。總體來論，中小學校園禁止含糖飲料利多於弊，國家未來主人翁的健康理所當然重於佳駐商家的利益，讓學生減少口腹之欲未嘗不是件好事。

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1